

Fler gravida får bröstcancer

2009-09-10 Samtidigt som bröstcancer blir allt vanligare bland gravida kvinnor pekar nya fynd på att sjukdomen underdiagnostiseras i denna patientgrupp.

FORSKARE

Namn: Therese Andersson, Anna Johansson, Chung-Cheng Hsieh, Sven Cnattingius och Mats Lambe. **Projekt:** Förekomst av graviditetsrelaterad cancer i Sverige. **Finansiering:** Cancerfonden.

I takt med att svenska kvinnor föder barn allt senare ökar andelen kvinnor som drabbas av bröstcancer under graviditet eller när de ammar.

Detta är viktigt att uppmärksamma, menar Mats Lambe, läkare och verksamhetschef för Regionalt onkologiskt centrum i Uppsala-Örebroregionen.

– Bröstcancer under eller i nära anslutning till graviditet drabbar en liten men inte negligierbar grupp kvinnor. Flera studier indikerar dessutom att prognosen är sämre för denna patientgrupp. En förklaring kan vara att biologiska förändringar i bröstet under graviditet och amning ger en gynnsammare miljö för tumörtillväxt och metastasering, säger han.

Mats Lambe och hans forskarkollegor har nu undersökt förekomsten av graviditetsnära bröstcancer i en av de största studierna hittills på området. I undersökningen ingick totalt 1 161 bröstcancerfall i Sverige under åren 1963 till 2002, där diagnosen ställdes under graviditet eller upp till två efter förlossning.

Inte överraskande fann forskarna att dessa graviditetsrelaterade fall ökar, från 16 per 100 000 förlossningar i början av perioden till 37 i slutet av perioden.

Men man fann också att antalet cancerfall under graviditet och sex månader därefter totalt sett inte var lika många som kunde förväntas i jämförelse med jämgamla icke-gravida kvinnor. Forskarna hittade totalt 99 fall under graviditet och 146 fall under sexmånadersperioden efter förlossning, mot förväntat 327 och 249.



Therese Andersson.

– Delvis tror vi att detta kan bero på att gravida kvinnor som drabbas av bröstcancer väljer att göra abort och därför försvinner ur vår statistik. Men vi har ingen förklaring till den låga siffran upp till sex månader efter förlossning, säger Therese Andersson, biostatistiker vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

En möjlig orsak skulle kunna vara att cancerdiagnosen försenas av

graviditeten, det vill säga att fler diagnoser än förväntat ställs något år efter förlossningen. Men sammantaget finner inte forskarna något klart stöd för detta i sin studie.

– Vår misstanke är ändå att bröstcancer underdiagnostiseras under graviditet och tiden därefter, vilket resultat från andra studier också pekar på. Det är viktigt med en ökad medvetenhet om detta bland både läkare och kvinnor i fertil ålder för att optimera handläggning och omhändertagandet av denna unga patientgrupp, säger Mats Lambe.

Den aktuella studien är publicerad i septembernumret av tidskriften *Obstetrics and Gynecology*.

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

<http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2009/09/10/fler-gravida-drabbas-av-br/index.xml>