

Svininfluensan och bröstcancer

Vi får många frågor hos oss på Amazona om vad som gäller om vaccinering mot svininfluensan för oss som en gång har haft bröstcancer.

Generellt gäller att alla som har eller har haft bröstcancer bör vaccinera sig även om vi inte tillhör någon högriskgrupp. Om man inte har påbörjat sin behandling är det bra att göra vaccineringen innan behandlingen startar.

De som har avslutat sin behandling anses inte som någon riskgrupp. Inte heller de som genomgår strålbehandling. De som får endokrin behandling (aromatashämmare eller antiöstrogenbehandling) tillhör inte heller någon riskgrupp. Dock bör vi alla vaccinera oss.

Viktigt är att anhöriga till cancerpatienter vaccinerar sig för att skydda den cancerdrabbade. Ofta är det de anhöriga som kommer hem med smittan.

För er övriga som är under pågående cytostatikabehandling, t.ex. standard FEC-behandling är rekommendationen den att man bör vaccineras dag 10 mellan kureorna.

De av oss som klassas som en högriskgrupp är de som får en högdosbehandling, dvs. inte vanlig standardbehandling med cytostatika. Dock anser man inte att vaccinering har någon effekt under pågående högdosbehandling. Istället är man till den här patientgruppen extra frikostig med antivirala läkemedel. Exempel på högdosbehandling är TAC, FEC100.

Många diskussioner pågår huruvida vaccineringen är säker eller ej. Själv förlitar jag mig helt på att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har säkerställt att vaccineringen är ofarlig och jag kommer därför själv se till att jag får vaccinet. Av solidaritet mot övriga, såsom våra ungdomar och de som tillhör riskgrupper är det viktigt att vi vaccinerar oss även om vi inte själva skulle bli sjuka av influensan. Vaccinering görs på din vårdcentral eller närmaste vaccinationsmottagning.

Maria Wiklund Karlsson